



NADAL® RSV Test (Respiratorisches Synzytial-Virus)

Schnelltest zum Nachweis von Antigenen des Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV)

RSV Infektion

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist eine der Hauptursachen von Atemwegserkrankungen aller Altersgruppen und weltweit verbreitet. Besonders bei Neugeborenen und Kleinkindern ist RSV der häufigste Erreger schwerer Atemwegserkrankungen. Die ernsthafteste Folge ist das Auftreten von Pneumonie oder Bronchiolitis zwischen dem 2. und 6. Lebensmonat.

Die Bronchiolitis wird mit Husten, Atemgeräuschen, beginnender Dyspnoe, erhöhter Atemfrequenz mit bis zu 40 Atemzügen pro Minute und bläulicher Verfärbung der Haut um den Mund diagnostiziert. Häufige Symptome der Pneumonie sind Atemnot und auskultatorisches Knistern (Crepitatio). Bei älteren und immungeschwächten Menschen ist RSV verantwortlich für schwere Verläufe mit hohen Mortalitätsraten.

Bei gesunden älteren Kindern und Erwachsenen verläuft die Erkrankung weniger schwer, ist im allgemeinen selbst-limitierend und ähnelt einer gewöhnlichen Erkältung.

Das RS-Virus ist überaus ansteckend. Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion sowie durch direkten oder indirekten Kontakt mit infektiösen Sekreten.

NADAL® RSV Test

Der NADAL® RSV Test ist ein immunchromatographischer *in-vitro* Test für die schnelle und qualitative Bestimmung von Antigenen des Respiratorischen Synzytial-Virus aus Abstrichen (Nasopharyngeal) oder nasopharyngealer Spülflüssigkeit/Aspirat.

Der Schnelltest eignet sich hervorragend für Praxen, Krankenhäuser und Labore. Durch eine kurze Testdauer von 10 Minuten und eine einfache Testauswertung ist der NADAL® RSV Test ein ideales Hilfsmittel zur Diagnose von RSV-Infektionen bei unklaren Erkältungsanzeichen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Schnelle und verlässliche Testergebnisse in nur 10 Minuten
- ✓ Frühzeitige Diagnose für eine bestmögliche Therapie
- ✓ Test-Lagerung bei Raumtemperatur
- ✓ Mindestens 12 Monate haltbar

